

Describir la capacidad de desempeño funcional en pacientes con de hemodiálisis crónica en un centro de la ciudad Mar del Plata
Número 0020

Autores: Iván Inchausti, Natalia Gasparri, Mónica Natalia Silva, Horacio José Iros, Vicente Cosme Lanza, Denis Allende, Silvia Elena Cristóbal, Nora Fuentes


Objetivo: describir la capacidad de desempeño funcional en términos actividad basica de la vida diaria (ABVD) y actividad instrumental de vida diaria (AIVD), capacidad cognitiva de los pacientes del centro.


Materiales y Métodos: Estudio de corte transversal descriptivo y analítico de pacientes del “Registro Institucional Multidisciplinario de Abordaje Integral de pacientes en HD (hemodiálisis) crónica” (RIMAIHD). Se incluyeron pacientes en tratamiento sustitutivo renal de HD de un centro de Mar del Plata, que tiene una población cautiva de aproximadamente 150 pacientes. Se evaluaron entre Diciembre 2017 a Mayo 2018. Se evaluó la capacidad funcional mediante el índice de Barthel para determinar grado de independencia en ABVD y mediante la escala de Lawton y Brody para determinar grado de independencia en AIVD. La capacidad cognitiva se evaluó mediante el test de minimental. Se registran otras variables tales como: sexo, edad y tiempo en HD. Todos los participantes aceptaron participar de las encuestas previo consentimiento informado verbal.

Resultados:

Características generales	N=54
Edad (años)	57 (24.75)*
Sexo masculino	32
Tiempo en HD (meses)	26 (40.50)*
Test de evaluación funcional	
AVD	100 (10)*
AVDI	8 (1) *
Minimental	34 (4)*

* las variables numéricas están expresadas como mediana y su intervalo intercuartil





En cuanto a la AVDI, si bien la población es globalmente independiente, los dominios en los pacientes no pudieron realizar fueron: hacer compras, preparar la comida, lavar la ropa y usar medios de transporte.

Conclusiones: como era esperable por la edad de la población las escalas de ABVD y AVDI no permiten valorar aspectos de desempeño y funcionalidad tales como actividad física diaria o actividad física global o aspectos y componentes específicos (motrices y sensoriales) de las áreas de desempeño ocupacional que podrían identificar algunas limitaciones funcionales propias de este tipo de pacientes. Es interesante el hallazgo de que en general las dificultades para la realización AIVD fueron las tareas que requieren mayor rendimiento de componentes físicos y no de componentes cognitivos consistente también con el score del mini-mental.